



ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу
Жіночі рідкі вагінальні супозиторії
SCHALI® Care-FM
Менструальні розлади

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу
Жіночі рідкі вагінальні супозиторії
SCHALI® Care-FM
Менструальні розлади

Жіночі рідкі вагінальні супозиторії для гігієни і профілактики менструальних розладів SCHALI® Care-FM сприяють відновленню гормонального фону і можуть використовуватися для місцевого застосування та під час фотодинамічної терапії в гінекології для лікування і профілактики розладів менструального циклу.

ФОРМА ВИПУСКУ:

Гідрогель профілактичний в індивідуальному одноразовому дозаторі 3 мл.

СКЛАД:

Вода очищена, 2-гідроксипропил-бета-циклодекстрин, двоокис титану, гідроксид натрію, гліцерет-18 етилгексонат, гліцерин, пропілен гліколь, акрілат, діазоліденіл сечовина, метилпарабен, пропілпарабен.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

М'який гідрогель в основі супозиторіїв, при поступовому розчиненні в піхві, всмоктуються в слизову оболонку, надає протизапальну, регенеруючу дію, а також зміцнює стінки судин і покращує кровотік в капілярах. Регулярне застосування супозиторіїв забезпечує налаштування імунної відповіді жіночого організму і запускає обмінні енергетичні реакції, нормалізує життєвий цикл клітин і процес їх регенерації, надає тривалу протианемічну і антиоксидантну дію.

Біокомпонент мінерального походження в складі гідрогелю включає в себе фрагменти кристалічної решітки двоокису титану особливого класу металоїдів-напівпровідників із ненасиченими зв'язками, що представляє собою елемент з підвищеною каталітичною активністю. Фотоактивні частинки титану серії QD SCHALI® забезпечують вироблення активних молекул кисню (синглетні форми кисню). Механізм дії препарату заснований на принципі енергетичної нейтралізації вільних хімічних зв'язків на поверхневих ділянках токсичних сполук шляхом їх насичення за допомогою комплементарних атомів кисню, що виробляються в результаті каталітичної реакції. Під впливом активного кисню припиняються практично всі екзогенні та ендогенні інтоксикації.

Крім того, під впливом активного кисню запускається механізм активації серотонінових рецепторів в організмі. Це сприяє регулюванню інгібування зворотного захоплення серотоніну шляхом вибіркового блокування всмоктування серотоніну мембраною пресинаптичної клітини. Усунення серотонінової недостатності відновлює гомеостаз і перериває танатогенез із подальшим загальним оздоровленням та налагодженням всіх функцій жіночого організму, включно нормалізацію внутрішніх обмінних процесів в клітинах і стану кровоносних судин, стимуляцію імунної та репродуктивної системи.

Двоокис титану також підвищує стійкість клітин епітелію піхви до інфекційних і запальних агентів, попереджає виникненню рекурентних інфекцій. Антибактеріальна та антимікробна дія двоокису титану ґрунтується на його здатності дезактивувати ненасичені хімічні зв'язки пептидів, глікозидів тощо, забезпечуючи видалення шкідливих токсичних з'єднань, що надходять ззовні - екзогенних, або зсередини ендогенних. Це, в свою чергу, спричиняє виражений ефект усунення симптомів різних патологій запального характеру.

Регулярне застосування супозиторіїв сприяє відновленню обміну речовин, зміцненню захисних сил організму, зниженню стомлюваності і підвищенню працездатності, а також допомагає підтримувати гарне самопочуття протягом всього менструального циклу.

Менструальний цикл стає більш регулярним, рідше спостерігаються хворобливі менструації, зменшується інтенсивність кровотечі, в результаті чого знижується ризик залізодефіцитної анемії. Зменшується вираженість різних симптомів ПМС, усувається емоційне напруження, зменшуються больові відчуття.

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях з профілактичною дією, так і під час комплексної та фотодинамічної терапії порушень менструального циклу.

Препарат має гіпоалергенні властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- ПМС
- Порушення менструального циклу
- Гіпоменорея. Мізерні місячні
- Альгоменорея. Болючі місячні
- Аменорея. Відсутність менструацій
- Порушення ановуляторного циклу

СПОСОБ ПРИМЕНЕННЯ:

Застосовувати вагінально.

Чистими руками дістати із упаковки індивідуальний одноразовий контейнер з продуктом, акуратно ввести його в піхву і видавити вміст контейнера. Введіть по 1 супозиторію 2 рази / добу протягом 30 днів. За необхідності можливе продовження курсу до 90 днів.

ПОБІЧНІ ДІЇ:

Побічних дій не виявлено.

Не розвивається залежність і не виникає синдром відміни.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Не застосовувати під час вагітності.

В інших випадках протипоказань не виявлено.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:

Продукт слід зберігати в непошкодженій упаковці в сухому темному місці при температурі не вище 25 °С.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Термін придатності становить 3 роки з дати виробництва.

Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Комплексні засоби SCHALI® Care виробляються за ліцензією No. 286-S