



ІНСТРУКЦІЯ  
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу  
Чоловічі ректальні супозиторії  
**SCHALI® Care-MI**  
Статеві інфекції / Захворювання і інфекції,  
що передаються статевим шляхом

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу**  
**Чоловічі ректальні супозиторії**  
**SCHALI® Care-MI**  
**Статеві інфекції / Захворювання і інфекції, що передаються статевим шляхом**

Чоловічі ректальні супозиторії для гігієни і профілактики статевих інфекцій SCHALI® Care-MI володіють протибактеріальною та протимікробною дією і призначені для місцевого застосування в гінекології для лікування та профілактики статевих інфекцій і захворювань, що передаються статевим шляхом.

**ФОРМА ВИПУСКУ:**

Капсули жирові профілактичні, 2г.

**СКЛАД:**

Масло какао, ефірні масла: троянди, ромашки, лакриці, чистотілу, гриффонії, гарбуза, SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub>-0.0006%.

**МЕХАНІЗМ ДІЇ:**

Супозиторії на основі натуральних рослинних масел, мінералів і фітоекстрактів, в процесі поступового розчинення в прямій кишці, всмоктуються в слизову оболонку нижніх відділів прямої кишки, надають протизапальну, регенеруючу дію, а також зміцнюють стінки судин і покращують кровотік в капілярах. Рослинні і мінеральні компоненти супозиторіїв та їх складові (ефірні масла, фітонциди) надають шкідливу дію на мікроорганізми.

Важливо, що навіть під час тривалого контакту з компонентами препарату мікроорганізми не виробляють до них резистентності. Регулярне застосування супозиторіїв активує природні механізми неспецифічного захисту, збільшує вироблення інтерферонів, імуноглобуліну А, таким чином, реалізуючи противірусну і протимікробну дію.

Протизапальна активність проявляється в захисті клітин від подальшого пошкодження, в ослабленні ексудативної фази процесу, в лейкоцитарній і макрофагальній інфільтрації, в посиленні проліферації клітин. Частково вона обумовлена антиоксидантним ефектом, тобто здатністю складових ефірних масел гальмувати вільнорадикальні реакції шляхом прямого зв'язування окислювальних речовин.

Механізм дії ромашки складається, в основному, в деструкції мембрани цитоплазми бактерій з подальшим порушенням обміну, аеробного дихання та процесів синтезу. Важливо, що навіть при тривалому контакті з компонентами препарату мікроорганізми не виробляють до них резистентності.

Антибактеріальна і антимікробна дія двоокису титану ґрунтується на його здатності дезактивувати ненасичені хімічні зв'язки пептидів, глікозидів і тому подібних, забезпечуючи видалення екзогенних, що надходять іззовні ззовні, та ендогенних (зсередини) шкідливих токсичних з'єднань. Це в свою чергу, має виражений ефект усунення симптомів різних патологій запального характеру.

Прополіс містить велику кількість біологічно активних речовин, що володіють імуномодулюючими властивостями (біофлавоноїди, цинк, полісахариди) і підвищують фагоцитарну активність імунних клітин. Під впливом супозиторіїв відбувається стимуляція синтезу антитіл, підвищується комплементарна активність крові і, як наслідок, значно знижується ризик повторного зараження.

Гліціризонова Гліциризонова кислота, яка міститься в корені солодки, стимулює вироблення залозами кортизону - гормону, що припиняє запальні процеси, завдяки цьому

різко зменшується кількість виділень, слизова захищається від роздратування, проникнення мікробів, зростання яких затримується внаслідок коагуляції білків мікробної стінки.

Продукт застосовується як з метою профілактики, так і під час комплексної терапії статевих інфекцій.

Препарат має гіпоалергенні властивості.

### **ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:**

#### **СТАТЕВІ ІНФЕКЦІЇ**

- Хламідіоз
- Уреаплазмоз
- Мікоплазмоз
- Гарднерельоз
- Трихомоніаз
- Гонорея
- Кандидоз
- Папіломавірусна інфекція
- Статевий герпес
- Цитомегаловірусна інфекція
- Стрептококова інфекція
- Стафілококова інфекція

### **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

Застосовувати ректально.

Перед застосуванням супозиторій слід звільнити від контурної упаковки. Чистими руками акуратно ввести супозиторій у задній прохід, лежачи на боці. Вводити по 1 супозиторію 2 рази / добу протягом 30 днів. При необхідності можливе продовження курсу до 90 днів.

### **ПОБІЧНІ ДІЇ:**

Побічних дій не виявлено.

Не розвивається залежність і не виникає синдром відміни.

### **ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

Протипоказань не виявлено.

### **ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:**

Продукт слід зберігати в непошкодженій упаковці в сухому темному місці при температурі не вище 25 °С.

### **ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:**

Термін придатності становить 3 роки з дати виробництва.

Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Комплексні засоби SCHALI® Care** виробляються за ліцензією No. 286-S